

Tag der Impfung

am Mittwoch, den
6. Oktober 2021

Hier in Ihrer Praxis

Gestaltung: www.schlund-design.de | Bildnachweis: istockphoto.com/Geber86



Weitere Informationen
erhalten Sie auf den nicht
kommerziellen Seiten:

www.impfen-info.de
www.rki.de

Wir nehmen teil!

Praxisstempel

► Wann?

am Mittwoch, den 06.10.2021

► Wo?

HIER in Ihrer Praxis

► Was?

Ein aktiver Thementag
zum Thema Impfung



Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten				Alter in Jahren								
		6	2-3	4	11-14*	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)											
Tetanus		G1	G2	G3 ^{b,c}		N	A1	N	A2		N	A (ggf. N) ^f		
Diphtherie		G1	G2	G3 ^{b,c}		N	A1	N	A2		N	A (ggf. N) ^f		
Pertussis (Keuchhusten)		G1	G2	G3 ^{b,c}		N	A1	N	A2		N	A3 ^{f,i}	ggf. N	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1	G2	G3 ^{b,c}		N								
Poliomyelitis (Kinderlähmung)		G1	G2	G3 ^{b,c}		N			A1		N	ggf. N		
Hepatitis B		G1	G2	G3 ^{b,c}		N								
Pneumokokken		G1	G2	G3 ^{b,c}	N								S ^g	
Meningokokken C				G1 (ab 12 Monate)		N								
Masern				G1	G2	N					S ^e			
Mumps, Röteln				G1	G2	N								
Varizellen (Windpocken)				G1	G2	N								
HPV (humane Papillomviren)									G1+2 ^d	N ^d				
Herpes zoster													G1+2 ^h	
Grippe (Influenza)												S ^k	S (jährlich)	

Erläuterungen:

- G** Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)
- S** Standardimpfung
- A** Auffrischimpfung
- N** Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d Standardimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
- h Zweimalige Impfung mit adjuvantiertem Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- i Bei schwangeren Frauen zu Beginn des 3. Trimenon (28. Schwangerschaftswoche), bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt bereits ins 2. Trimenon vorziehen
- k Schwangere ab dem 2. Trimenon (14. Schwangerschaftswoche)

in Anlehnung an RKI Impfkalendar 2021 * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden: MMR und V am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand.

Beugen Sie vor – machen Sie mit!

Geht es Ihnen auch so? Anschlussimpfung verpasst, alles wieder von vorne. Oder sind Sie sich unsicher, welche Impfung überhaupt für Sie sinnvoll ist? Am Tag der Impfung erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Impfung.

Impfen in der Pandemie?

Gerade während einer Pandemie kommt allgemein gültigen Präventionsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit große Bedeutung zu.

Neben den anderen Vorsorgeuntersuchungen sollte auch unabhängig von CORONA der Impfstatus überprüft und vervollständigt werden.

Was findet statt?

Bringen Sie am 06.10.2021 Ihren Impfpass zu uns mit und wir beraten Sie zu fälligen Impfungen, führen diese wenn möglich gleich durch.

Damit schützen Sie sich und Ihre Liebsten auch weiterhin.